

Date: 18/11/2024

Produit: PHÉROMONE LASIODERMA SERRICORNE

Pays: France



PHÉROMONE LASIODERMA SERRICORNE

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Type de produit | Désinfestation - Phéromones et attractifs |
| | Description | Attractifs de différents types (sexuels, alimentaires ou d'agrégation), spécifiques aux ravageurs les plus fréquents qui attaquent les produits stockés, qu'ils soient alimentaires ou textiles. Indiqué pour être combiné avec différents types de moniteurs. |

| | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Composition | Phéromones spécifiques |
| | Format de présentation | Boîtes de 15 unités |
| | Référence interne | [3290] |

| | | |
|--------------|-------------------|---|
| USAGE | Mode d'emploi | Placer la phéromone à l'intérieur du piège, puis placer le piège à une hauteur maximale de 1,8-2 m. Ces pièges doivent être utilisés à l'intérieur des industries alimentaires, des entrepôts, des herboristes et tous les lieux où l'on stocke : pain, pâtes, thé, camomille, tabac, fruits secs, espèces, etc. Remarque : le flacon en polyéthylène ne doit pas être ouvert. Le flacon libère progressivement la phéromone à travers ses parois et son couvercle. Toute ouverture accidentelle ne compromet pas son efficacité. Nous conseillons même d'utiliser des gants à chaque manipulation de la phéromone. L'éventuelle odeur de fumée ou d'autres odeurs sur les mains pourrait nuire à l'efficacité du produit. Nous vous suggérons de donner un numéro à chaque piège et d'indiquer son emplacement sur le plan de la zone surveillée, afin de faciliter le contrôle lors du contrôle périodique. Distance des pièges : 100 m ² . Période de surveillance suggérée : toute l'année. Fréquence suggérée des contrôles : Chaque semaine, changer le diffuseur de phéromones tous les deux mois. |
| | Organismes cibles | <i>Lasioderma serricornes</i> (coléoptère du tabac) |

| | | |
|----------------|----------------|---|
| DANGERS | Avertissements | - |
|----------------|----------------|---|

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| STOCKAGE | Stockage | Conditions de stockage : dans un local frais et sec, température inférieure à 25°C et R.H. inférieur à 55 %. S'il est bien conservé (emballage intact), la durée de conservation du produit est de 3 ans. Dès l'ouverture du récipient, la phéromone dure 60 jours. |
| | Élimination | - |

AUTRES COMMENTAIRES

Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le

ATTENTION : Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'utilisateur assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit. Le Département Réglementaire n'est pas responsable de toute modification apportée à ce document sans son examen et approbation. Cette Fiche Technique n'est pas contraignante. Veuillez vérifier l'autorisation ou la MSDS.

FICHE TECHNIQUE – Département Réglementaire

Date: 18/11/2024

Produit: PHÉROMONE LASIODERMA SERRICORNE

Pays: France



grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

ATTENTION : Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'utilisateur assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit. Le Département Réglementaire n'est pas responsable de toute modification apportée à ce document sans son examen et approbation. Cette Fiche Technique n'est pas contraignante. Veuillez vérifier l'autorisation ou la MSDS.